

ARC e o uso de adjuvantes

Por: Fabiana Oliveira

Especialista de Marketing Clínico



Em uma pesquisa feita pela Coloplast Global, 45% dos estomizados apresentam algum distúrbio na pele periestoma e em 77% dos casos, o diagnóstico está relacionado ao contato da pele com as fezes e/ou urina. Muito embora o vazamento seja uma preocupação frequente para essas pessoas, elas não conseguem encontrar a relação entre eles e estas situações são encaradas como “comum”.

Associada a escolha correta do equipamento coletor e dos adjuvantes, a Coloplast vem renovando suas ferramentas no intuito de trazer novas soluções para atender os pacientes com necessidades íntimas especiais e acreditamos que estabelecer uma rotina correta de troca de bolsa. Observando três passos encontraremos o tempo ideal de uso do equipamento. São eles: 1º) Aplicação correta do adesivo, o ajuste preciso é importante para uma pele livre de distúrbios; 2º) Remoção correta do adesivo para assegurar a integridade da pele e 3º) Observação da condição do adesivo e da pele ao redor do estoma,

fazendo com que o desgaste e o tempo de troca não sejam ultrapassados e a pele sofra com o contato desses efluentes.

Associado ao passo a passo de uma rotina correta de troca de bolsas, vem a escolha do equipamento certo e adjuvantes necessários para manter uma qualidade de vida essencial para aqueles com necessidades íntimas de saúde. A Coloplast vem ampliando seu portfólio para melhor atender seus usuários.

Pense novo. Pense **Brava®**. Buscando aumentar a qualidade de vida ao dia a dia do estomizado.

Lançamento linha Brava de adjuvantes

NOVO Brava Lenço Barreira



Reduza os problemas de pele causados por vazamentos. Os mesmos benefícios do spray agora em lenço.

- Seca em segundos
- Permite colagem de adesivos
- Forma uma barreira contra os efluentes